

2020年北京市朝阳区高三一模数学逐题解析

第一部分（选择题 共40分）

一、选择题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $A = \{1, 3, 5\}$ ， $B = \{x \in \mathbf{Z} \mid (x-1)(x-4) < 0\}$ ，则 $A \cup B =$

A. $\{3\}$

B. $\{1, 3\}$

C. $\{1, 2, 3, 5\}$

D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】C

【解析】由题可得 $B = \{2, 3\}$ ，根据集合运算法则可得 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ ，故选 C.

2. 下列函数中，既是偶函数又在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是

A. $y = x^3$

B. $y = -x^2 + 1$

C. $y = \log_2 x$

D. $y = 2^{|x|}$

【答案】D

【解析】对于 A: $y = x^3$ ，不为偶函数，故错误；

对于 B: $y = -x^2 + 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数，故错误；

对于 C: $y = \log_2 x$ 不为偶函数，故错误；

对于 D: $y = 2^{|x|}$ 为偶函数且在 $(0, +\infty)$ 上为增函数，故正确；

故选 D.

3. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_4=-8$, 则 $\{a_n\}$ 的前 6 项和为

A. -21

B. 11

C. 31

D. 63

【答案】A

【解析】因为 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_1=1$, $a_4=-8$, 则 $q = \sqrt[3]{\frac{a_4}{a_1}} = -2$, $S_6 = \frac{1 \times [1 - (-2)^6]}{1 - (-2)} = -21$,

故选 A.

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E 满足 $\overline{BC} = 2\overline{BD}$, $\overline{CA} = 3\overline{CE}$, 若 $\overline{DE} = x\overline{AB} + y\overline{AC}$ ($x, y \in \mathbf{R}$),


则 $x + y =$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$



【答案】B

【解析】因为 $\overline{BC} = 2\overline{BD}$, 所以 $\overline{DC} = \frac{1}{2}\overline{BC}$,

$\overline{CA} = 3\overline{CE}$, 所以 $\overline{EC} = \frac{1}{3}\overline{AC}$,

$\overline{DE} = \overline{DC} + \overline{CE} = \frac{1}{2}\overline{BC} - \frac{1}{3}\overline{AC}$, $\overline{BC} = \overline{AC} - \overline{AB}$,

所以 $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{AC} - \frac{1}{2}\overline{AB} - \frac{1}{3}\overline{AC} = -\frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{6}\overline{AC}$,

解得 $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{6}$, $x + y = -\frac{1}{3}$, 故选 B.

5. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 准线为 l , 点 A 是抛物线 C 上一点, $AD \perp l$ 于 D . 若 $AF = 4$, $\angle DAF = 60^\circ$, 则抛物线 C 的方程为

A. $y^2 = 8x$

B. $y^2 = 4x$

C. $y^2 = 2x$

D. $y^2 = x$

【答案】 B

【解析】 设 l 与 x 轴交于点 B , 在抛物线中 $AD = AF$, 且 $\angle DAF = 60^\circ$


所以 $\triangle ADF$ 为等边三角形

因为 $AF = 4$, $DF = 4$

直角三角形 $\triangle DBF$ 中 $\angle BFD = 60^\circ$, $BF = p$

所以 $DF = 2p$

$2p = 4$, $p = 2$, 所以方程为 $y^2 = 4x$, 故选 B.



6. 现有甲、乙、丙、丁、戊 5 种在线教学软件, 若某学校要从中随机选取 3 种作为教师“停课不停学”的教学工具, 则其中甲、乙、丙至多有 2 种被选取的概率为

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{9}{10}$

【答案】 D

【解析】 设“甲、乙、丙至多有 2 种被选”为事件 A ,

则“甲、乙、丙都被选”为事件 \bar{A} .

$$P(\bar{A}) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10},$$

所以甲、乙、丙至多有 2 种被选的概率为 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{9}{10}$, 故选 D.


7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=BC$, $\angle ABC=120^\circ$, 若以 A, B 为焦点的双曲线经过点 C , 则该双曲线的离心率为

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

D. $\sqrt{3}$



【答案】C

【解析】焦距 $AB=2c$, 所以 $BC=2c$

$\triangle ABC$ 为顶角为 120° 的等腰三角形, $AC=2\sqrt{3}c$

因为 $2a=AC-BC=2\sqrt{3}c-2c$

所以 $\frac{c}{a}=\frac{2}{2\sqrt{3}-2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$, 故选 C.

8. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x-\varphi)$ ($\omega>0$) 的图象上相邻两个最高点的距离为 π , 则

“ $\varphi=\frac{\pi}{6}$ ”是“ $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称”的

A.充分而不必要条件

B.必要而不充分条件

C.充分必要条件

D.既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】相邻两个最高点距离为一个周期, 所以 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}=\pi$, 因为 $\omega>0$, 所以 $\omega=2$.

所以 $f(x)=\sqrt{3}\sin(2x-\varphi)$.

充分性:

若 $\varphi=\frac{\pi}{6}$, $f(x)=\sqrt{3}\sin(2x-\frac{\pi}{6})$

当 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, 代入 $f(x)$ 可得 $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3} \sin(\frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$, 此时函数取得最大值,

所以 $x = \frac{\pi}{3}$ 是 $f(x)$ 的对称轴, 所以具有充分性.

必要性:

若 $f(x)$ 关于 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 则 $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3} \sin(\frac{2}{3}\pi - \varphi) = \pm\sqrt{3}$, $\frac{2}{3}\pi - \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$

$\varphi = -k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}$, 所以不具有必要性,

故选 A.

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax + 2a, & x \leq 1. \\ 2x - a \ln x, & x > 1. \end{cases}$ 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq \frac{a}{2}$ 在 \mathbf{R} 上恒成立, 则

实数 a 的取值范围为

A. $(-\infty, 2\sqrt{e}]$

B. $[0, \frac{3}{2}]$

C. $[0, 2]$

D. $[0, 2\sqrt{e}]$

【答案】C

【解析】方法一：特值法+排除法

因为 $f(x) \geq \frac{a}{2}$ 在 \mathbf{R} 上恒成立,

当 $a = -2$ 时, $\frac{a}{2} = -1$, $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x - 4, & x \leq 1. \\ 2x + 2 \ln x, & x > 1. \end{cases}$

有 $f(-2) = 4 - 8 - 4 = -8 < \frac{a}{2}$, 矛盾, 故排除 A 选项;

当 $a = 2$ 时, $\frac{a}{2} = 1$, $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4, & x \leq 1. \\ 2x - 2 \ln x, & x > 1. \end{cases}$

$x \leq 1$ 时, $f(x) = x^2 - 4x + 4$, 对称轴直线 $x = 2$, 所以 $f(x) \geq f(1) = 1$,

$x > 1$ 时, $f(x) = 2x - 2\ln x$, $f'(x) = 2 - \frac{2}{x} > 0$, 所以 $f(x) > f(1) = 2$,

故在 \mathbf{R} 上 $f(x)_{\min} = 1$, 所以 $f(x) \geq \frac{a}{2}$ 恒成立, 排除 B 选项;

当 $a = 4$ 时, $\frac{a}{2} = 2$, $f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 8, & x \leq 1. \\ 2x - 4\ln x, & x > 1. \end{cases}$

有 $f(1) = 1 - 8 + 8 = 1 < \frac{a}{2}$, 矛盾, 故排除 D 选项;

故选 C.

方法二:

令 $g(x) = x^2 - 2ax + 2a, x \leq 1$, 对称轴为 $x = a$.

当 $a \leq 1$ 时, $g(x)_{\min} = g(a) = -a^2 + 2a \geq \frac{a}{2}$, 有 $0 \leq a \leq 1$,

当 $a > 1$ 时, $g(x)_{\min} = g(1) = 1 \geq \frac{a}{2}$, 有 $1 < a \leq 2$,

综上 $0 \leq a \leq 2$;

令 $h(x) = 2x - a\ln x, x > 1$, $h'(x) = 2 - \frac{a}{x}, x > 1$,


因为 $g(1) \geq \frac{a}{2}$, 所以 $a \leq 2$, 有 $h'(x) > 0$ 恒成立, 所以 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 递增,

所以 $h(1) = 2 \geq \frac{a}{2}$, 所以 $a \leq 4$;

取交集, 得 $0 \leq a \leq 2$, 故选 C.

10. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别是棱 AB, BB_1 的中点, 点 P 在对角线 CA_1 上运动, 当 $\triangle PMN$ 的面积取得最小值时, 点 P 的位置是

- A. 线段 CA_1 的三等分点, 且靠近点 A_1
 B. 线段 CA_1 的中点
 C. 线段 CA_1 的三等分点, 且靠近点 C
 D. 线段 CA_1 的四等分点, 且靠近点 C



【答案】B

【解析】建立以 A 为原点, 以 \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AD} , $\overrightarrow{AA_1}$ 方向分别为 x, y, z 轴正方向的空间直角坐标系. 设正方体的棱长为 1, P 为 A_1C 上动点, 可设 $P(\lambda, \lambda, 1-\lambda)$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$.

$$M\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), N\left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{经计算 } |PM| = \sqrt{\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 + \lambda^2 + (1-\lambda)^2} = \sqrt{3\lambda^2 - 3\lambda + \frac{5}{4}},$$

$$|PN| = \sqrt{(\lambda - 1)^2 + \lambda^2 + \left(1 - \lambda - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3\lambda^2 - 3\lambda + \frac{5}{4}},$$

所以 $|PM| = |PN|$, $\triangle PMN$ 为等腰三角形, 底边 $|MN| = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$\text{设底边 } MN \text{ 上的高为 } h, \text{ 则有 } h = \sqrt{|PM|^2 - \left(\frac{|MN|}{2}\right)^2} = \sqrt{|PM|^2 - \frac{1}{8}},$$

而 $3\lambda^2 - 3\lambda + \frac{5}{4} = 3\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$, 在 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时最小, 此时 P 为 CA_1 中点, 故选 B.

第二部分（非选择题 共 110 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。


11. 若复数 $z = \frac{2}{1+i}$ ，则 $|\bar{z}| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 $z = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1-i$,

$\bar{z} = 1+i \Rightarrow |\bar{z}| = \sqrt{2}$.

12. 已知某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的最长棱的长为 _____，它的体积为 _____.




【答案】 5; 4

【解析】 $AB = AC = 2\sqrt{2}, BC = 4$,

$$AD = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

$$BD = CD = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 3^2} = \sqrt{17}$$

最长棱为 5，体积 $V = \frac{1}{3} \times 4 \times 2 \times \frac{1}{2} \times 3 = 4$.



13. 某购物网站开展一种商品的预约购买,规定每个手机号只能预约一次,预约后通过摇号的方式决定能否购买到该商品.规则如下:(i) 摇号的初始中签率为0.19;(ii) 当中签率不超过1时,可借助“好友助力”活动增加中签率,每邀请到一位好友参与“好友助力”活动可使中签率增加0.05.为了使中签率超过0.9,则至少需要邀请_____位好友参与到“好友助力”活动.

【答案】 15

【解析】 设需 x 位好友,

$$0.19 + 0.05x > 0.9, x \in \mathbf{N},$$

$$x > 14.2,$$

所以 $x = 15$.

14. 已知函数 $f(x) = x \cos \frac{\pi x}{2}$. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = f(n) + f(n+1) (n \in \mathbf{N}^*)$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 100 项和是_____.

【答案】 100

【解析】 因为 $a_n = f(n) + f(n+1) = n \cos \frac{n\pi}{2} + (n+1) \cos \frac{(n+1)\pi}{2}$,

$$\text{所以 } a_{4n-3} = (4n-3) \sin(2n\pi) - (4n-2) \cos(2n\pi),$$

$$a_{4n-2} = -(4n-2) \cos(2n\pi) + (4n-1) \sin(2n\pi),$$

$$a_{4n-1} = (4n-1) \sin(n\pi) + (4n) \cos(2n\pi),$$

$$a_{4n} = (4n) \cos(2n\pi) - (4n+1) \sin(2n\pi),$$


$$\text{所以 } a_{4n} + a_{4n-1} + a_{4n-2} + a_{4n-3} = 4,$$

所以 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 4$, $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 4$, 依次类推, 可知 $a_{97} + a_{98} + a_{99} + a_{100} = 4$.

$$\text{所以 } S_{100} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{97} + a_{98} + a_{99} + a_{100} = 4 \times 25 = 100.$$

15. 数学中有许多寓意美好的曲线, 曲线 $C: (x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$ 被称为“四叶玫瑰线”(如图所示). 给出下列三个结论:

- ①曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称;
- ②曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过 1;
- ③存在一个以原点为中心、边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 使得曲线 C 在此正方形区域内(含边界).



(第 15 题图)

其中, 正确结论的序号是_____.

注: 本题给出的结论中, 有多个符合题目要求. 全部选对得 5 分, 不选或者有错选得 0 分, 其他得 3 分.

【答案】 ①②

【解析】 ①将点 (y, x) 代入曲线方程, 与原式相同, 则曲线关于 $y = x$ 对称, 故①正确.

②设曲线上一点坐标 $P(x_0, y_0)$, 则到坐标原点距离 $d = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$,

因为 $P(x_0, y_0)$ 在曲线上, 则 $(x_0^2 + y_0^2)^3 = 4x_0^2y_0^2$,

$$x_0^2 + y_0^2 \geq 2\sqrt{x_0^2y_0^2} = 2\sqrt{\frac{(x_0^2 + y_0^2)^3}{4}},$$

$$\text{所以 } x_0^2 + y_0^2 \geq \sqrt{(x_0^2 + y_0^2)^3},$$

$$\text{所以 } (x_0^2 + y_0^2)^2 \geq (x_0^2 + y_0^2)^3,$$

$$\text{所以 } x_0^2 + y_0^2 \leq 1,$$

所以 $d \leq 1$, 当且仅当 $x_0^2 = y_0^2$ 时取等,

所以曲线到坐标原点距离不超过 1, 故②正确.

③由图可知, 曲线 C 关于 x, y 轴对称且关于原点中心对称,

则在第一象限内, 由②可知, $x^2 + y^2 \leq 1$, 当且仅当 $x^2 = y^2 = \frac{1}{2}$ 时取等,

当 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, d 有最大值,

若正方形边长为 $\sqrt{2}$, 且中心为原点, 则第一象限内的正方形边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,

即正方形右上顶点为曲线 C 到原点距离最大的点,

过该点向 x, y 轴作垂线, 可知曲线上的部分点不在该正方形区域内, 故③错误.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演练步骤或证明过程。

16. (本小题 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中， $b \sin A = a \cos(B - \frac{\pi}{6})$.

(I) 求 B ;

(II) 若 $c = 5$, 求 a .

从① $b = 7$; ② $C = \frac{\pi}{4}$ 这两个条件中任选一个，补充在上面问题中并作答.

注：如果选择多个条件分别作答，按第一个解答计分.

【解析】

(I) 由正弦定理得： $\sin B \sin A = \sin A \cos(B - \frac{\pi}{6})$

$\because A \in (0, \pi) \therefore \sin A \neq 0$

$\therefore \sin B = \cos(B - \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B$

$\therefore \tan B = \frac{\sin B}{\cos B} = \sqrt{3}$

$\because B \in (0, \pi) \therefore B = \frac{\pi}{3}$

(II) 若选择条件①，则 $B = \frac{\pi}{3}, b = 7, c = 5$ ，求 a .

由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ ，得 $49 = a^2 + 25 - 5a$

$\therefore (a - 8)(a + 3) = 0$

$\because a > 0$

$\therefore a = 8$

另解:

若选择条件②, 则 $B = \frac{\pi}{3}, C = \frac{\pi}{4}, c = 5$, 求 a .

$$\because A + B + C = \pi, \therefore A = \frac{5\pi}{12}$$

$$\therefore \sin A = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{由正弦定理: } \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\therefore a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{5}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{5(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{2\sqrt{2}} = \frac{5(\sqrt{3} + 1)}{2}$$

17. (本小题 14 分)

如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 ABC , 四边形 ACC_1A_1 是正方形, 点 D, E 分别是棱 BC, BB_1 的中点, $AB = 4, AA_1 = 2, BC = 2\sqrt{5}$.


(I) 求证: $AB \perp CC_1$;

(II) 求二面角 $D - AC_1 - C$ 的余弦值;

(III) 若点 F 在棱 B_1C_1 上, 且 $B_1C_1 = 4B_1F$,

判断平面 AC_1D 与平面 A_1EF 是否平行,

并说明理由.



【解析】

(I) 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中,

\because 四边形 ACC_1A_1 是正方形, $\therefore CC_1 \perp AC$,

又 \because 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 ABC , 平面 $ACC_1A_1 \cap$ 平面 $ABC = AC$,

且 $CC_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 ,

$\therefore CC_1 \perp$ 平面 ABC , 又 $\because AB \subset$ 平面 ABC , $\therefore AB \perp CC_1$.

(II) 由(I)知, $CC_1 \perp AC$, $CC_1 \perp AB$, 且 $CC_1 // AA_1$, $\therefore AA_1 \perp AC$, $AA_1 \perp AB$,

又 \because 正方形 ACC_1A_1 中, $AA_1=2$, $\therefore AC=2$, $AB=4$, $BC=2\sqrt{5}$,

$\therefore BC^2 = AC^2 + AB^2$, $\therefore AC \perp AB$,

则以 A 为原点, AB 为 x 轴, AA_1 为 y 轴, AC 为 z 轴建立空间直角坐标系,

$\therefore A(0,0,0)$, $C(0,0,2)$, $B(4,0,0)$, $C_1(0,2,2)$, $\therefore D$ 为 BC 中点, $\therefore D(2,0,1)$,

又 $\because AB \perp AC$, $AB \perp AA_1$, 且 $AC \cap AA_1 = A$, $AC \subset$ 平面 ACC_1 , $AA_1 \subset$ 平面 ACC_1 ,

$\therefore AB \perp$ 平面 ACC_1 , \therefore 平面 ACC_1 的法向量为 $\mathbf{n}=(1,0,0)$,

设平面 ADC_1 法向量为 $\mathbf{m}=(x,y,z)$, $\overrightarrow{AD}=(2,0,1)$, $\overrightarrow{AC_1}=(0,2,2)$,

$$\text{则} \begin{cases} \mathbf{m} \perp \overrightarrow{AD} \\ \mathbf{m} \perp \overrightarrow{AC_1} \end{cases}, \therefore \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AC_1} = 0 \end{cases}, \therefore \begin{cases} 2x + z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases}, \text{令 } z = -2, \text{ 得 } x = 1, y = 2,$$

则 $\mathbf{m}=(1,2,-2)$, 设二面角 $D-AC_1-C$ 为 θ ,

$$\text{则 } |\cos \theta| = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{|1|}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}, \text{ 又二面角 } D-AC_1-C \text{ 为锐角,}$$

\therefore 二面角 $D-AC_1-C$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

(III) 由 (II) 知, $B_1(4,2,0)$, $B(4,0,0)$, $A_1(0,2,0)$, 且 E 为 BB_1 中点,

$\therefore E(4,1,0)$, $\overrightarrow{B_1C_1}=(-4,0,2)$, 又 $\because F$ 在棱 B_1C_1 上, 且 $B_1C_1=4B_1F$,

$\therefore \overrightarrow{B_1F} = \frac{1}{4}\overrightarrow{B_1C_1} = (-1,0,\frac{1}{2})$, $\therefore F(3,2,\frac{1}{2})$, $\therefore \overrightarrow{A_1F} = (3,0,\frac{1}{2})$ 且 $\overrightarrow{A_1E} = (4,-1,0)$,

设平面 A_1EF 法向量为 $\mathbf{a}=(x_1,y_1,z_1)$,

$$\therefore \begin{cases} \mathbf{a} \perp \overrightarrow{A_1F} \\ \mathbf{a} \perp \overrightarrow{A_1E} \end{cases}, \therefore \begin{cases} \mathbf{a} \cdot \overrightarrow{A_1F} = 0 \\ \mathbf{a} \cdot \overrightarrow{A_1E} = 0 \end{cases}, \therefore \begin{cases} 3x_1 + \frac{1}{2}z_1 = 0 \\ 4x_1 - y_1 = 0 \end{cases},$$

令 $x_1=1$, 则 $y_1=4$, $z_1=-6$, $\therefore \mathbf{a}=(1,4,-6)$,

又平面 AC_1D 法向量为 $\mathbf{m}=(1,2,-2)$, 则 \mathbf{a} 与 \mathbf{m} 不平行,

\therefore 平面 AC_1D 与平面 A_1EF 不平行.

18. (本小题 14 分)

某科研团队研发了一款快速检测某种疾病的试剂盒.为了解该试剂盒检测的准确性,质检部门从某地区(人数众多)随机选取了80位患者和100位非患者,用该试剂盒分别对他们进行检测,结果如下:

患者的检测结果	人数
阳性	76
阴性	4

非患者的检测结果	人数
阳性	1
阴性	99

(I) 从该地区患者中随机选取一人,对其检测一次,估计此患者检测结果为阳性的概率;

(II) 从该地区患者中随机选取3人,各检测一次,假设每位患者的检测结果相互独立,以 X 表示检测结果为阳性的患者人数,利用(I)中所得概率,求 X 的分布列和数学期望;

(III) 假设该地区有10万人,患病率为0.01.从该地区随机选取一人,用该试剂盒对其检测一次.若检测结果为阳性,能否判断此人患该疾病的概率超过0.5? 并说明理由.

【解析】

(I) 设“80名患者中随机抽取1人检测结果为阳性”为事件 A ,

由表知,80名患者中,检测结果为阳性的人数为76人,

由频率估计概率得, $P(A) = \frac{76}{80} = \frac{19}{20}$.

(II) 由(I)知, $P = P(A) = \frac{19}{20}$, 且 X 的可能取值为 0,1,2,3

$$P(X=0) = C_3^0 \left(\frac{19}{20}\right)^0 \left(\frac{1}{20}\right)^3 = \frac{1}{8000}, \quad P(X=1) = C_3^1 \left(\frac{19}{20}\right)^1 \left(\frac{1}{20}\right)^2 = \frac{57}{8000}$$

$$P(X=2) = C_3^2 \left(\frac{19}{20}\right)^2 \left(\frac{1}{20}\right)^1 = \frac{1083}{8000}, \quad P(X=3) = C_3^3 \left(\frac{19}{20}\right)^3 \left(\frac{1}{20}\right)^0 = \frac{6859}{8000}$$

X 的分布列如下:

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{8000}$	$\frac{57}{8000}$	$\frac{1083}{8000}$	$\frac{6859}{8000}$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{8000} + 1 \times \frac{57}{8000} + 2 \times \frac{1083}{8000} + 3 \times \frac{6859}{8000} = \frac{57}{20}.$$

(III) 不能判断此人患该疾病的概率超过 0.5, 理由如下:

该地区 10 万人中患者 $100000 \times 0.01 = 1000$ 人,

经该试剂盒检测: 患者检测结果为阳性应为 $1000 \times \frac{19}{20} = 950$ 人,

非患者检测结果为阳性应为 $99000 \times \frac{1}{100} = 990$ 人,

设“该人检测结果为阳性且患该疾病”为事件 B ,

$$\text{则 } P(B) = \frac{950}{950+990} < \frac{1}{2},$$

所以, 该人患病概率不会超过 0.5.

19. (本小题 14 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 圆 $O: x^2 + y^2 = r^2$ (O 为坐标原点). 过点 $(0, b)$ 且

斜率为 1 的直线与圆 O 交于点 $(1, 2)$, 与椭圆 C 的另一个交点的横坐标为 $-\frac{8}{5}$.

(I) 求椭圆 C 的方程和圆 O 的方程;

(II) 过圆 O 上动点 P 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 若直线 l_1 的斜率为 $k (k \neq 0)$ 且 l_1 与椭圆 C 相切, 试判断直线 l_2 与椭圆 C 的位置关系, 并说明理由.

【解析】

(I) 将点 $(1, 2)$ 代入圆 O 得 $r^2 = 1 + 4 = 5$, 故圆 O 的方程为 $x^2 + y^2 = 5$

设过点 $(0, b)$, 斜率为 1 的直线为 $y = x + b$

将点 $(1, 2)$ 代入得 $2 = 1 + b$, 故 $b = 1$, 该直线方程为 $y = x + 1$

将 $x = -\frac{8}{5}$ 代入, 得 $y = -\frac{3}{5}$

将 $(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$ 代入椭圆 C , 得 $\frac{64}{25a^2} + \frac{9}{25} = 1$, 解得 $a^2 = 4$

故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

(II) l_2 与椭圆 C 相切.

证明: 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 5$

过点 $P(x_0, y_0)$ 的直线 l_1 为 $y - y_0 = k(x - x_0)$

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y - y_0 = k(x - x_0) \end{cases}$$

$$\text{得 } (1+4k^2)x^2 + 8k(y_0 - kx_0)x + 4(y_0 - kx_0)^2 - 4 = 0$$

$$\Delta = 64k^2(y_0 - kx_0)^2 - 4(1+4k^2)[4(y_0 - kx_0)^2 - 4] = 16[4k^2 + 1 - (y_0 - kx_0)^2] \quad \text{①}$$

因为 l_1 与椭圆 C 相切

所以 $\Delta = 0$

$$\text{即 } 4k^2 + 1 - (y_0 - kx_0)^2 = 0$$

$$\text{即 } 2kx_0y_0 = y_0^2 + k^2x_0^2 - 4k^2 - 1 \quad \text{②}$$

设 l_2 与椭圆 C 联立后的判别式为 Δ'

因为 $l_2 \perp l_1$

所以 l_2 的斜率为 $-\frac{1}{k}$ ，将①式中的 k 替换成 $-\frac{1}{k}$ ，得

$$\Delta' = 16\left[\frac{4}{k^2} + 1 - \left(y_0 + \frac{x_0}{k}\right)^2\right]$$

$$= 16\left(\frac{4}{k^2} + 1 - y_0^2 - \frac{x_0^2}{k^2} - \frac{2x_0y_0}{k}\right)$$

$$= 16 \cdot \frac{4 + k^2 - k^2y_0^2 - x_0^2 - 2kx_0y_0}{k^2}$$

代入②，得

$$\Delta' = 16 \cdot \frac{4 + k^2 - k^2y_0^2 - x_0^2 - y_0^2 - k^2x_0^2 + 4k^2 + 1}{k^2}$$

$$= 16 \cdot \frac{5 + 5k^2 - (x_0^2 + y_0^2)(1 + k^2)}{k^2}$$

再代入 $x_0^2 + y_0^2 = 5$ ，得

$$\Delta' = 0$$

故 l_2 与椭圆 C 相切.

20. (本小题 15 分)

$$\text{已知函数 } f(x) = e^x - \frac{x+1}{x-1}.$$

- (I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (II) 判断函数 $f(x)$ 的零点的个数, 并说明理由;
- (III) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个零点, 证明曲线 $y = e^x$ 在点 (x_0, e^{x_0}) 处的切线也是曲线 $y = \ln x$ 的切线.

【解析】

$$(I) f'(x) = e^x - \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} = e^x + \frac{2}{(x-1)^2}$$

$$f(0) = 1 + 1 = 2, \quad f'(0) = 1 + 2 = 3,$$

$$\text{切线 } y = 3x + 2$$

(II) 方法一:

由 (I) 知当 $x \in (-\infty, 1), (1, +\infty)$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

$$f(-2) = \frac{1}{e^2} - \frac{1}{3} < 0, \quad f(0) > 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上有且只有一个零点,

$$f(2) = e^2 - 3 > 0, \quad f\left(\frac{5}{4}\right) = e^{\frac{5}{4}} - 9 < 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有且只有一个零点,

所以 $f(x)$ 有 2 个零点.

方法二:

由 (I) 知 $f'(x) = e^x + \frac{2}{(x-1)^2} > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

因为 $f(-1) = \frac{1}{e} > 0$, $f(-2) = \frac{1}{e^2} - \frac{1}{3} < 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上有唯一零点 x_1 , 且 $x_1 \in (-2, -1)$, $f(x_1) = 0$, 即 $e^{x_1} = \frac{x_1 + 1}{x_1 - 1}$

因为 $1 < -x_1 < 2$, $f(-x_1) = e^{-x_1} - \frac{-x_1 + 1}{-x_1 - 1} = \frac{x_1 - 1}{x_1 + 1} + \frac{-x_1 + 1}{x_1 + 1} = 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有唯一零点 $-x_1$,

综上, $f(x)$ 有且只有 2 个零点.

$$(III) f(x_0) = e^{x_0} - \frac{x_0 + 1}{x_0 - 1} = 0, \quad \textcircled{1}$$

$y = e^x$ 在 (x_0, e^{x_0}) 处的切线为 $l_1: y - e^{x_0} = e^{x_0}(x - x_0)$

即 $l_1: y = e^{x_0}x + e^{x_0}(1 - x_0)$

代入①得 $y = e^{x_0}x + \frac{x_0 + 1}{x_0 - 1}(1 - x_0)$

即 $y = e^{x_0}x - 1 - x_0$

设 $y = \ln x$ 上一点 $(x_2, \ln x_2)$, 在点 $(x_2, \ln x_2)$ 处的切线 $l_2: y - \ln x_2 = \frac{1}{x_2}(x - x_2)$

当 $\frac{1}{x_2} = e^{x_0}$ 时, $l_2: y = e^{x_0}x - 1 - x_0$,

此时 l_2 与 l_1 重合,

所以 $y = e^x$ 在 (x_0, e^{x_0}) 处的切线也是 $y = \ln x$ 的切线.

21. (本小题14分)

设数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 3)$ 的各项均为正整数, 且 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. 若对任意 $k \in \{3, 4, \dots, n\}$, 存在正整数 $i, j (1 \leq i \leq j < k)$ 使得 $a_k = a_i + a_j$, 则称数列 A 具有性质 T .

(I) 判断数列 $A_1: 1, 2, 4, 7$ 与数列 $A_2: 1, 2, 3, 6$ 是否具有性质 T ; (只需写出结论)

(II) 若数列 A 具有性质 T , 且 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = 200$, 求 n 的最小值;

(III) 若集合 $S = \{1, 2, 3, \dots, 2019, 2020\} = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4 \cup S_5 \cup S_6$, 且 $S_i \cap S_j = \emptyset$ (任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, 6\}, i \neq j$). 求证: 存在 S_i , 使得从 S_i 中可以选取若干元素 (可重复选取) 组成一个具有性质 T 的数列.

【解析】

(I) 数列 A_1 不具有性质 T ; 数列 A_2 具有性质 T .

(II) 由题可知 $a_2 = 2, a_3 \leq 2a_2 = 4, a_4 \leq 2a_3 \leq 8, \dots, a_8 \leq 2a_7 \leq 128$,

所以 $n \geq 9$.

若 $n = 9$, 因为 $a_9 = 200$ 且 $a_9 \leq 2a_8$, 所以 $128 \geq a_8 \geq 100$.

同理, $64 \geq a_7 \geq 50, 32 \geq a_6 \geq 25, 16 \geq a_5 \geq 12.5, 8 \geq a_4 \geq 6.25, 4 \geq a_3 \geq 3.125$.

因为数列各项均为正整数, 所以 $a_3 = 4$. 数列前三项为 $1, 2, 4$.

因为数列 A 具有性质 T , a_4 只可能为 $4, 5, 6, 8$ 之一, 而又因为 $8 \geq a_4 \geq 6.25$,

所以 $a_4 = 8$.

同理, 有 $a_5 = 16, a_6 = 32, a_7 = 64, a_8 = 128$.

此时数列为 $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 200$.

但数列中不存在 $1 \leq i \leq j < 9$ 使得 $200 = a_i + a_j$, 所以该数列不具有性质 T .

所以 $n \geq 10$

当 $n=10$ 时, 取 $A: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 36, 64, 100, 200$ (构造数列不唯一)

经验证, 此数列具有性质 T .

所以, n 的最小值为 10.

(III) 反证法: 假设结论不成立, 即对任意 $S_i (i=1, 2, \dots, 6)$ 都有:

若正整数 $a, b \in S_i, a < b$, 则 $b - a \notin S_i$,

否则, 当 $a < b - a$ 时, $a, b - a, b$ 是一个具有性质 T 的数列;

当 $a > b - a$ 时, $b - a, a, b$ 是一个具有性质 T 的数列;

当 $a = b - a$ 时, a, a, b 是一个具有性质 T 的数列.

(i) 由题意可知, 这 6 个集合中至少有一个集合的元素个数不少于 337 个, 不妨设此集合为 S_1 , 从 S_1 中取出 337 个数, 记为 a_1, a_2, \dots, a_{337} , 且 $a_1 < a_2 < \dots < a_{337}$,

令集合 $N_1 = \{a_{337} - a_i \mid i=1, 2, \dots, 336\} \subseteq S$.

由假设, 对任意 $i=1, 2, \dots, 336, a_{337} - a_i \notin S_1$, 所以 $N_1 \subseteq S_2 \cup S_3 \cup S_4 \cup S_5 \cup S_6$.

(ii) 在 S_2, S_3, S_4, S_5, S_6 中至少存在一个集合 N_1 包含中的至少 68 个元素, 不妨设这个集合为 S_2 , 从 $S_2 \cap N_1$ 中取出 68 个数, 记为 b_1, b_2, \dots, b_{68} , 且 $b_1 < b_2 < \dots < b_{68}$.

令集合 $N_2 = \{b_{68} - b_i \mid i=1, 2, \dots, 67\} \subseteq S$.

由假设 $b_{68} - b_i \notin S_2$.

对任意 $k=1, 2, \dots, 68$, 存在 $s_k \in \{1, 2, \dots, 336\}$ 使得 $b_k = a_{337} - a_{s_k}$,

所以对任意 $i=1, 2, \dots, 67, b_{68} - b_i = (a_{337} - a_{s_{68}}) - (a_{337} - a_{s_i}) = a_{s_i} - a_{s_{68}}$,

由假设 $a_{s_i} - a_{s_{68}} \notin S_1$, 所以 $b_{68} - b_i \notin S_1$, 所以 $b_{68} - b_i \notin S_1 \cup S_2$,

所以 $N_2 \subseteq S_3 \cup S_4 \cup S_5 \cup S_6$.

(iii) 在 S_3, S_4, S_5, S_6 中至少有一个集合包含 N_2 中的至少 17 个元素, 不妨设这个集合为 S_3 , 从 $S_3 \cap N_2$ 中取出 17 个数记为 c_1, c_2, \dots, c_{17} , 且 $c_1 < c_2 < \dots < c_{17}$.

令集合 $N_3 = \{c_{17} - c_i \mid i = 1, 2, \dots, 16\} \subseteq S$.

由假设 $c_{17} - c_i \notin S_3$.

对任意 $k = 1, 2, \dots, 17$, 存在 $l_k \in \{1, 2, \dots, 67\}$ 使得 $c_k = b_{68} - b_{l_k}$,

所以对任意 $i = 1, 2, \dots, 16, c_{17} - c_i = (b_{68} - b_{l_{17}}) - (b_{68} - b_{l_i}) = b_{l_i} - b_{l_{17}}$,

同样, 由假设可得 $b_{l_i} - b_{l_{17}} \notin S_1 \cup S_2$, 所以 $c_{17} - c_i \notin S_1 \cup S_2 \cup S_3$,

所以 $N_3 \subseteq S_4 \cup S_5 \cup S_6$.

(iv) 类似地, 在 S_4, S_5, S_6 中至少有一个集合包含 N_3 中的至少 6 个元素, 不妨设这个集合为 S_4 , 从 $S_4 \cap N_3$ 中取出 6 个数, 记为 d_1, d_2, \dots, d_6 , 且 $d_1 < d_2 < \dots < d_6$,

则 $N_4 = \{d_6 - d_i \mid i = 1, 2, \dots, 5\} \subseteq S_5 \cup S_6$.

(v) 同样, 在 S_5, S_6 中至少有一个集合包含 N_4 中的至少 3 个元素, 不妨设这个集合为 S_5 , 从 $S_5 \cap N_4$ 中取出 3 个数, 记为 e_1, e_2, e_3 , 且 $e_1 < e_2 < e_3$,

同理可得 $N_5 = \{e_3 - e_1, e_3 - e_2\} \subseteq S_6$.

(vi) 由假设可得 $e_2 - e_1 = (e_3 - e_1) - (e_3 - e_2) \notin S_6$.

同上可知, $e_2 - e_1 \notin S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4 \cup S_5$,

而又因为 $e_2 - e_1 \in S$, 所以 $e_2 - e_1 \in S_6$, 矛盾.

所以假设不成立.

所以原命题成立.